

KREUZALLERGIEN - PATIENTENINFO

www.trinicum.com

TRINICUM

Zentrum für Integrative Medizin
und Schmerztherapie

ALLERGEN	Birkenpollen	Beifußpollen	Hausstaubmilbe	Latex	Ficus benjamina
Häufigkeit der Sensibilisierung bei Atopikern	sehr häufig ca. 40%	häufig 15-20%	sehr häufig 35%	selten 3-5%	selten bis zu 2%
mögliche assoziierte Nahrungsmittelallergien	Kern-Steinobst v.a. Apfel, Kirsche Pfirsich Nüsse wie Walnuss Mandel, Haselnuss Erdnuss Soja Doldenblütler wie Karotte, Sellerie Petersilie, Kümmel Anis, Fenchel Kiwi Erdbeeren Maulbeergewächse Feigen, Jack-Frucht Maulbeerfruchte Paprika Kaki Weintraube Erdäpfel	Sellerie Gewürze wie Kümmel, Anis Koriander Pfeffer, Curry Basilikum Rosmarin Majoran Mango Litschi Kürbisgewächse wie Melonen Zucchini Gurke Paradeiser andere Korbblütler wie Kamille, Sonnenblume - Honig! Kreuzblütler wie Senf Brokkoli, Karfiol, Kohl Knoblauch, Zwiebel	Krebstiere Shrimps Hummer Krabbe Weichtiere Muscheln Austern Schnecken Tintenfisch	Bananen Avocado Maroni Kiwi Pfirsich Papaya Feige Mango	Feige=ficus carica Kiwi Papaya Papain (Mürbsatz) Banane Ananas
Häufigkeit klinischer Symptome bei Sensibilisierten	sehr häufig 60-70%	gelegentlich weniger 10%	selten bis 5%	häufig 25-50%	häufig 30-50%

modifiziert nach W.Hemmer, Österreichische Ärztezeitung 2006, Mit freundlicher Genehmigung v. Univ.Prof. Dr. Birger Kränke LKH Graz, Klein. Abtl f Umweltdermatologie und Venerologie